

# Situación de los Jóvenes con énfasis en las ITS, el VIH y el SIDA en la Región Autónoma del Atlántico Sur



---

## INTRODUCCION

---

El Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes (JENH – CEDEHCA) fundado en 1999 bajo el Programa de Empoderamiento Juvenil de CEDEHCA está conformado por más de 500 jóvenes costeños en municipios de ambas Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua.

La Misión de JENH – CEDEHCA es *“Contribuir al Empoderamiento Juvenil en la Costa Caribe de Nicaragua mediante la promoción del liderazgo, la organización y participación activa y efectiva de jóvenes en los diversos espacios de toma de decisiones relacionadas al desarrollo de sus comunidades y el desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua en general.”*

En la Costa Caribe de Nicaragua, principalmente en la Región Autónoma del Atlántico Sur la situación de la juventud se vuelve cada día más precaria debido a la falta de recursos y de políticas públicas, dirigidas a promover su efectiva participación en los procesos de toma de decisiones y su inclusión en el mundo laboral. Como consecuencia de esto, las y los adolescentes y jóvenes de la RAAS se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, expuestos a la delincuencia<sup>1</sup>, el consumo de drogas, las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH y sida<sup>2</sup>.

En ese contexto, presentamos el **“II informe sobre las situación de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH y sida en la Región Autónoma del Atlántico Sur”**, el cual fue realizado en coordinación con la Coalición de Juventudes del Caribe (COJUCA), Asociación Campaña Costeña Contra el SIDA, Acción Medica Cristiana, MINSA-SILAIS, Asociación Centro Regional Información Conserjería (ACRIC) y el Delegado de la Secretaria de la Juventud en la RAAS.

---

<sup>1</sup> Según datos de la delegación regional de la policía en la RAAS en el 2008 se detuvieron a 69 personas, 50 Hombres y 19 mujeres. Los principales delitos fueron contra las personas (20 casos reportados), contra la propiedad (25 casos reportados) y los relacionados con el consumo o expendio de droga (24 delitos reportados). 50 % del los detenidos son menores o jóvenes que comprenden las edades entre los 15 a los 26 años. Esto denota un aumento sustancial en el consumo y expendio de drogas situación que afecta principalmente a los adolescentes y jóvenes. la Policía tiene identificados 853 expendios de drogas en todo el país. Las Regiones Atlántico Norte y Sur tienen 143 expendios, lo que significa un 16.76 por ciento, mientras el 27.68 por ciento restantes se encuentran distribuidos en otras zonas del país.

<sup>2</sup> Fuente (Nuevo Diario) las estadísticas revelan que por cada 1.8 hombres portadores hay una mujer afectada, pero en el segmento de adolescentes la relación es uno a uno.

En este II informe presentamos también los esfuerzos que se hacen por las diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil por detener la propagación del VIH y sida y las Infecciones de Transmisión Sexual.

---

## SITUACIÓN DE LAS ITS, EL VIH y EL SIDA EN LA REGIÓN AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO SUR

---

### Contexto global

El VIH y el SIDA amenazan a la infancia como nunca antes. A pesar de que la mayoría de las personas que viven con el VIH son adultas, una sexta parte del total de las personas que mueren por causas relacionadas con el sida y una séptima parte de las personas que contraen el VIH en el mundo, son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no llegan a los 24 años de edad. A medida que nos acercamos al inicio de la tercera década de la epidemia, un niño o niña muere cada minuto de cada día por causas relacionadas con el sida, y una persona joven contrae el VIH cada 15 segundos.

Cada día que pasa 6,000 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años contraen el VIH, se producen más de 2,000 infecciones de niños y niñas, en su mayoría por transmisión vertical (de madre a hijo) y unos 1,400 niños y niñas menores de 15 años mueren por causas relacionadas por el sida. Más de 15 millones de niños y niñas han perdido a la madre o padre, o ambos, por causas relacionadas con la epidemia. Sin embargo una abrumadora mayoría de adolescentes y jóvenes no tienen todavía información sobre cómo evitar el contagio, incluso en los países donde la enfermedad está propagándose rápidamente y alcanzando niveles de pandemia.

A tres décadas del inicio de la pandemia, una de las áreas en las cuales ha progresado menos es la que engloba a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el VIH y el SIDA. Menos del 10 % de las mujeres embarazadas que viven con el VIH tienen acceso a información para evitar transmitir el virus a sus hijos o a tratamiento antirretroviral para tratar de impedir que la enfermedad progrese; menos del 3 % de los niños y las niñas que han perdido a sus padre o madre por causa del SIDA, reciben apoyo o tienen acceso a servicios.

A menos de 10 años de la meta para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, uno de los cuales es detener la epidemia de VIH y sida y comenzar a reducirla, es necesario plantear medidas concretas de todos los sectores de la sociedad. Si no se toman las decisiones correctas, la tasa de infección aumentará aún más en países donde ya es peligrosamente elevada.

## **Contexto Nacional**

Nicaragua es el país de Centroamérica que presenta las cifras más bajas de contagio de VIH, sin embargo éste sigue en aumento y lo que es peor según los datos oficiales y de organizaciones que abordan la temática, el VIH y SIDA tiene un nuevo rostro y es el de una mujer joven, ya que éste es el segmento que más se está afectando con el virus. De septiembre de 1987 a septiembre de 2009 se reportan oficialmente 4,600 personas portadoras de VIH y SIDA, pero las proyecciones de ONU-SIDA, calculan que los casos deben de andar en los 5,100 y 7,000 esto debido al hecho de que aún cuando las pruebas son gratis en los centros públicos hospitalarios y en algunas instituciones no gubernamentales, la mayoría de las personas no acude a realizársela.

En Nicaragua, según datos de UNICEF, las condiciones han mejorado, para las personas afectadas por el VIH y SIDA, por ejemplo el personal médico en los hospitales, ya atiende con más calidez, existe un mayor esfuerzo por el gobierno y organizaciones no gubernamentales por garantizar los medicamentos, hay más información sobre cómo prevenir los contagios y se trata de garantizar un mayor acceso a los preservativos, sin embargo la situación sigue siendo alarmante, ya que el número de personas afectadas va en aumento, situación que según datos del Centros de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) afecta principalmente a los adolescentes y jóvenes, quienes a pesar de tener información sobre que es el VIH y SIDA y cómo se trasmite, no utilizan el preservativo en las relaciones con sus parejas (según datos de un estudio realizado por el Centro de Estudios Políticos Sociales, un 90 % de la población adolescente y joven conoce sobre el VIH y SIDA pero solo un 20% o menos usa el preservativo).

Hasta noviembre del año 2009, ya son 411 los nuevos casos detectados por las autoridades de salud y el grupo más afectado con 241 casos es el de niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años de edad.

## Resumen de datos epidemiológicos de VIH y SIDA en Nicaragua de 1987 a septiembre del 2009

Se reportan oficialmente 4,600 casos VIH, de los cuales 1,003 son mujeres y 1,827 son hombres, 400 casos en etapa de SIDA en personas del sexo masculino, 150 casos en etapa de SIDA en personas del sexo femenino y total de 750 fallecidos de los cuales 593 son hombres y 157 son mujeres.

*Tabla resumen de datos epidemiológicos de VIH y SIDA en Nicaragua al semestre 2009*

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD	Año 2008	2009
Total de casos	3,465	4,600
VIH	2,229	2,830
Casos SIDA	463	550
Fallecidos	723	750
Datos incompletos	50	0

Fuente: MINSNA

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD A SEPTIEMBRE DEL 2009		
Condición	Mujer	Hombre
VIH	1,003	1,827
Con SIDA	150	400
Fallecido	157	593

Fuente: MINSNA

Nuevos casos de VIH y sida por grupo de edades	
Rango de edad	Casos
25 a 29 años	106
20 a 24 años	81
30 a 34 años	70
35 a 39 años	27
15 a 19 años	37
40 a 44 años	27
45 a 49 años	22
50 a más años	24
0 a 14 años	17

Fuente MINSNA 411 nuevos casos reportados 241 fueron en niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años.

Los SILAIS de mayor prevalencia, son Managua, Chinandega, León, Masaya, la Región Autónoma del Atlántico Norte y la Región Autónoma del Atlántico Sur.

## Resumen de datos epidemiológicos de VIH y SIDA SILAIS RAAS Mayo 1991-NOVIEMBRE 2009.

Este cuadro muestra el total de personas contagiadas con el virus hasta noviembre del 2009, el estado de los casos, las personas que reciben tratamiento y las etapas que se encuentran.

<b>TOTAL DE PERSONAS:</b>	<b>142</b>
Personas con VIH vivos y en seguimiento:	35
Personas en etapa SIDA recibiendo Tratamiento Antirretroviral:	48
Personas fallecidos:	38
Personas referidos otros SILAIS:	3
Personas con condición actual desconocido:	16
Embarazadas con VIH recibiendo Tratamiento Antirretroviral para TMI	2

En el 2008 se reportaron 122 casos de VIH y SIDA según datos a noviembre del corriente se reportan 20 nuevos contagios, estos nuevos casos encontrados fueron detectados en la ciudad de Bluefields.

**Personas con VIH y SIDA por lugar de origen  
SILAIS RAAS Mayo 1991 – Noviembre 2009**

Municipio	91	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Total
C. Island	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	4	5	0	14
LCRG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Bluefields	0	3	8	1	1	0	1	1	6	7	3	8	7	18	14	18	9	105
L/Perlas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4
Kukra Hill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	5
Tortuguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karawala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6
Rama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	5
Desconocido	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>142</b>

11 años

35 personas

6 años

107 personas

Bluefields continúa siendo la ciudad que reporta mayor número de contagios con 105 casos, 14 casos más de los reportados en el 2008, con Island reporta 14 casos, es decir que en el 2009 se detectó un nuevo caso, en Karawala se reportan 6 casos 2 más de los 4 que se reportaron el año pasado, los municipios de Rama y Kukra Hill presentan 5 casos respectivamente, presentando un nuevo contagio en el Rama que presentaba 4 el año pasado y se mantiene la misma cantidad de casos reportados en el municipio de Kukra Hill. Laguna de Perlas presenta 4 casos, uno más ya que en el 2008 se reportaban tres casos, durante años la Cruz del Río Grande no presentaba casos, sin embargo este año el municipio ya presenta su primer caso a diferencia del Tortuguero que sigue sin presentar caso de VIH y SIDA.

En la Región Autónoma del Atlántico Sur, particularmente en Bluefields, existen varios organismos no gubernamentales con financiamiento extranjero, que ofrecen servicios gratuitos de la prueba del VIH, sin embargo salvo pocas excepciones, ésta se realiza mayoritariamente en la cabecera regional.

Esta tabla nos muestra que El VIH y SIDA en la RAAS afecta principalmente a niños, adolescentes y jóvenes menores de 34 años de edad, éste es el segmento que más se está afectando con el virus.

Personas con VIH según edad-sexo Mayo 1991-Noviembre 2009															
Menores de 4a		5-9 a		10-14 a		15-19 a		20-34 a		35-49 a		50-59 a		60 y mas a	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
1	2	0	0	1	0	2	1	39	45	13	23	4	9	0	2
3		0		1		3		84		36		13		2	

En los últimos cuatro años ( 2006-2009 ) se han detectados 89 casos de los 142 casos que se reportan a nivel regional, esto se debe a que hay una mayor presencia de organizaciones que realizan de manera gratuita y confidencial la prueba y existe mayor conciencia entre los pobladores y principalmente entre los jóvenes de realizarse la prueba del VIH, así mismo existe una mayor preocupación por prevenir la transmisión vertical, por lo que existe un mayor interés en dar información a las mujeres embarazadas para que se hagan la prueba del VIH en los centros de salud y otras organizaciones que trabajan con el Ministerio de Salud.

**Personas con VIH y Sida según municipio y trimestre de captación  
SILAIS RAAS año 2006– año 2009**

Municipios	AÑO 2006				AÑO 2007				AÑO 2008				AÑO 2009				Total
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
C. Island	0	0	0	1	1	1	0	2	1	2	0	2	0	0	0	0	10
LCRG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Bluefields	5	2	5	6	5	7	2	0	4	6	1	7	2	5	1	1	59
L/Perlas	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Kukra Hill	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5
Tortuguero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karawala	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	6
Rama	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4
Desconocido	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Sub T</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>89</b>
<b>Gran Total</b>	<b>23</b>				<b>24</b>				<b>30</b>				<b>12</b>				

Las raíces del estigma asociado al VIH/SIDA descansan profundamente en las estructuras genéricas (de género), económicas, raciales y sexuales, que pueden ser encontradas en cada sociedad. No constituye una coincidencia el hecho de que los numerosos estigmas asociados al VIH/SIDA se encuentren relacionados con las divisiones e inequidades de género - como queda expresado en la creencia de que tan solo las “malas” mujeres se infectan -; a las divisiones raciales y étnicas - como en la creencia de que el SIDA constituye una enfermedad africana (u occidental) -; a las diferencias en el estatus económico - expresado en la consideración de que son las personas pobres (o ricas) quienes se infectan y enferman de SIDA -; y a las relaciones y divisiones sexuales - como en la creencia de que tan solo las trabajadoras sexuales, las personas “promiscuas” y los homosexuales, son los que pueden infectarse con el virus.

Los siguientes cuadros muestran como las antiguas creencias se han ido desmitificando a tal punto que son las amas de casa y las personas heterosexuales las que presentan mayor número de contagios de la enfermedad superando la antiguas creencias de que el VIH y SIDA es una enfermedad de prostitutas, negros y homosexuales.

En la RAAS según su ocupación, las amas de casa son las que presentan mayor número de contagios de la enfermedad, seguidos de los marinos y pescadores, los obreros, el sector desempleado y luego profesionales de diferentes ramas y estudiantes universitarios.

Ocupación / actividad laboral	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Obreros (as)	1	12	13
Ama de casa	38	0	38
Marinos y Pescadores	1	27	28
Profesores	1	3	4
T. Salud	1	2	3
Profesionales	2	2	4
TCS	2	0	2
Comerciantes	1	3	4
Estudiantes	2	2	4
Desempleados	1	13	14
Otros	9	14	23
No aplica	1	2	3
Desconocido	0	2	2
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>142</b>

El contagio entre parejas heterosexuales sigue siendo mayor con 120 casos reportados, seguido de las relaciones bisexuales con 9 y las homosexuales con 8.

Según información de organizaciones que trabajan con grupos de homosexuales, bisexuales, lesbianas y trabajadoras sexuales, éste es el sector poblacional que cuenta con más información sobre cómo protegerse y evitar el contagio, esto debido a los estigmas de los cuales fueron víctimas.

P/Sexual	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Heterosexual	59	61	120
Bisexual	0	9	9
Homosexual	0	8	8
No aplica	1	2	3
Desconocido	0	2	2
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>142</b>

Esta tabla muestra a las personas con VIH y sida según su etnia, encontrando que la etnia que presenta mayor número de casos reportados son los Mestizos con 51, seguido de los creoles con 45, luego los Miskitos con 23, seguidos por los Ramas y Garífunas con 1 respectivamente. Existen 20 casos en los cuales se desconoce la etnia a la cual pertenecen. Esto se debe en parte a la accesibilidad que tiene estas etnias a los servicios de salud y a la realización de la prueba gratuita.

Etnias	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Mestizos	23	28	51
Creoles	17	28	45
Miskitu	11	12	23
Garifuna	0	1	1
Rama	0	1	1
Otros	0	1	1
Sin D	9	11	20
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>142</b>

Esquemas de los que tomas ARVs	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Duovir + Efavirenz	10	29	39
3TC+ d4T + Efavirenz	2	2	4
3TC+ d4T + Indinavir + Ritonavir	0	1	1
Duovir + Kaletra	1	0	1
Duovir+ Nevirapina (PTMI)	2	0	2
Duovir + EFV (pediátrico)	0	1	1
Duovir+ Nevirapina (pediátrico)	1	0	1
Truvada + Nevirapina	0	1	1
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>50</b>

---

## EN LA RAAS EXISTEN ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE TRABAJAN LA TEMATICA DE VIH Y SIDA Y LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

---

### **Personas recibiendo Terapia Anti-Retro viral Esquemas SILAIS RAAS Mayo 1991 Noviembre 2009**

Estas organizaciones entre otras actividades brindan siguientes servicios a la población en general, con mayor énfasis en los adolescentes y jóvenes

1. Información para la prevención del VIH y SIDA y las ITS
2. Se reparten de manera gratuita preservativos (condones)
3. Celebración del primero de diciembre Día Internacional de lucha contra la discriminación que sufren las personas que conviven con el VIH.
4. Trabajo con la población para disminuir la discriminación hacia las personas que conviven con la enfermedad.
5. Se realizan pruebas gratuitas y confidenciales
6. Campañas de comunicación dirigidas a promover la utilización del condón,
7. la abstinencia, la fidelidad como métodos de prevenir el contagio del VIH y sida.
8. Atención médica a personas que conviven con el VIH y SIDA
9. Talleres de capacitación a adolescentes y jóvenes
10. Cuñas radiales y pautas televisivas con mensajes dirigidos a la prevención
11. Campañas ambulantes de pruebas rápidas para la detección temprana y un tratamiento a tiempo.
12. Campañas dirigidas a mujeres embarazadas para la detección temprana y evitar el contagio vertical.

13. Grupos de autoayuda con personas que conviven con el VIH y sida
14. Incidencia política con el fin de influir en los tomadores de decisiones a todos los niveles comunal, municipal, regional y nacional.

Procedencia de personas que toman ARVs	# Pacientes
Corn Island	2
Kukra Hill	2
Sandy Bay Municipio Karawala	3
C/S Juan Manuel Morales Municipio Bluefields	9
P/S Puerto el Bluff Municipio Bluefields	1
Hospital Regional Dr.E.S.B., Municipio Bluefields	32
El Rama	1
<b>Total</b>	<b>50</b>

### Conclusiones y recomendaciones

1. Las mujeres (principalmente las amas de casa), los jóvenes y adolescentes siguen siendo los más vulnerables culturalmente, debido a la dependencia económica, social y emocional de la mujer e irresponsabilidad de los y las jóvenes. Es por ello, que es más difícil que se pueda rechazar una relación sexual de riesgo.
2. En Nicaragua y en especial en la Costa Caribe, una de las principales causas por las cuales las y los Adolescentes y jóvenes adquirimos el VIH, es por la falta de información objetiva y acorde a las tradiciones y costumbres de la región.
3. Existe información más acorde a la realidad de la región, sin embargo se hace necesario un mayor esfuerzo por parte de todas las organizaciones que trabajan la temática.
4. Es necesario realizar campañas promoviendo la realización de pruebas rápidas, así como la instalación de puestos fijos y ambulantes de pruebas rápidas en todos los municipios de la región.
5. Se hace necesario una mayor divulgación de la ley 238 y exigir un cumplimiento efectivo de la misma, que permita disminuir la discriminación y estigma hacia las personas con VIH y Sida.

6. Se necesita mayor participación en la gestión educativa de las familias, escuelas, comunidades y en especial de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la cual es fundamental para dar una respuesta integral y con enfoque de derechos humanos. Es necesaria la unión de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad.
7. Promover campañas juveniles en las Comunidades, Universidades y Colegios instando a los jóvenes a realizarse la prueba del VIH por lo menos 1 vez al año.
8. Organizar jornadas informativas en las que se distribuyan gratuitamente preservativos e información sobre el VIH y sida.
9. Continuar realizando encuentros deportivos en donde se promuevan los derechos sexuales y reproductivos.
10. Seguir utilizando la cultura como una buena práctica, para concientizar a los adolescentes y jóvenes sobre la importancia del uso del condón.
11. Hay que aprovechar el Plan de Acción del Programa de País 2008-2012 entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que tiene como ejes fundamental es el trabajo con niñez y adolescencia y la consecución de la reducción de la pandemia del VIH y SIDA en Nicaragua y en especial en la Costa Caribe del país.

Enfermedades como El VIH y el SIDA son capaces de extraer lo mejor de las personas, pero también pueden poner en evidencia lo peor. Hacen emerger lo mejor cuando las personas se unen de forma solidaria para combatir la marginación y para ofrecer apoyo y cuidados a aquellos afectados por la epidemia. Ponen en evidencia lo peor cuando éstos últimos resultan estigmatizados y maltratados profundamente por las personas que aman, por su familia y por sus comunidades. Tales acciones, no pocas veces, conducen a la discriminación y a la violación de los derechos humanos (Peter Aggleton, Richard Parker y Miriam Maluwa)

## Infecciones de Transmisión Sexual



Las ITS, son infecciones causadas por varios tipos de microbios que viven en nuestros genitales (pene, vulva y vagina) y en el año de las personas infectadas. Algunas veces las ITS no presentan síntomas o señales tanto en la mujer como en el hombre y podemos estar transmitiéndola a otras personas sin saberlo y peor todavía, transmitiéndolas a nuestros hijos también.

Existe un total de 20 infecciones de transmisión sexual todas son prevenibles y todas son tratables y la mayoría puede curarse. Las más conocidas son:

1. Gonorrea
2. Clamidia
3. Tricomoniasis
4. Sífilis
5. Chancroide
6. Linfogramuloma venéreo
7. Herpes Genital
8. Candidiasis
9. Hepatitis B
10. Virus del Papiloma Humano
11. VIH
12. Otros

El Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) registra durante los primeros diez meses del año, enero a octubre, al menos 10 mil 953 casos de enfermedades de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

“Estamos hablando de 10 mil 953 personas que por una u otra ITS llegaron a buscar tratamientos”, reveló la responsable del programa de VIH y SIDA. De esos casos, 10 mil 732 fueron captados entre mujeres que se presentaron a los distintos centros de salud, en busca de cura; los otros 221 fueron “hombres” que buscaron atención médica.



## **Principales causas del alto índice de Infecciones por Transmisión Sexual en la RAAS**

1. La falta de cultura por parte de los hombres de asistir a los centros a realizarse chequeos y conseguir información.
2. La poca presencia de organizaciones que brinden información constante.
3. La información que se brinda no está acorde a las costumbres o cosmovisiones de las comunidades.
4. Los altos índice de migración del interior del país hacia las comunidades.
5. La migración de los jóvenes al exterior en busca de trabajo que luego regresan a sus comunidades.
6. Los centros de salud no cuentan con sistemas amigables de atención a adolescentes y jóvenes.
7. Los centros de salud se quedan desabastecidos de preservativos y no existen en la mayoría de las comunidades presencia constante de otras organizaciones que den gratuitamente preservativos.

# Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos



## **Teléfonos:**

Bluefields: (505) 25721914      Bilwi: (505) 87922292  
Managua: (505) 22664256

## **Correo Electrónico:**

informacion@cedehcanicaragua.com  
programajuventudraas@cedehcanicaragua.com  
jenhraan@cedehcanicaragua.com

## **Página Web:**

[www.cedehcanicaragua.com](http://www.cedehcanicaragua.com)